

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen potentiaaliset käyttäjät? (7/7)

- **Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)**

- IBS:n esiintyvyys väestössä vaihteli 5%:n (Rooma II) ja 16%:n (Manning 2) välillä. Rooma II kriteerit täyttävillä oli vaikeammat vatsaoireet ja suuremmat vatsavaivoihin liittyvät vuotuiset terveystaloudelliset kustannukset kuin Manning 2 kriteerit täyttävillä (497€ / henkilö vs. 295€ / henkilö). [10, s. 10-11]
- IBS:llä on huomattava vaikutus kansallisiin terveydenhoidosta aiheutuviin kuluihin. IBS:n (Manning 2) vatsavaivojen ja muiden oireiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat jopa 5% avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista Suomessa. [10, s. 11]
- 5 % vuotuiset kustannukset 4562 miljoonasta eurosta (vuosi 2009) olivat 230 miljoonaa euroa. [10, s. 52]
- **==> Siis yhden ainoan toiminnallisen häiriön hoito maksoi 230 miljoonaa euroa vuonna 2009**

- **Vuoden 2024 tilasto:**

- 31.12.2024: 0-9 vuotiaita 502 575 ja 10-19 vuotiaita 638 400 eli 0-19 vuotiaita oli 1 140 975 henkilöä [6]
- 31.12.2024: Suomen väkiluku oli 5 635 971 [4], joten aikuisia (eli 20 – 75+ vuotiaita) oli: $5\,635\,971 - 1\,140\,975 = 4\,494\,996$.
- **==> IBS:stä (Manning 2) kärsiviä aikuisia oli $0,16 * 4\,494\,996 = 719\,000$ vuonna 2024**

- **Lähteet:**

- [4] Väkiluku [verkkajulkaisu]. Viimeisin päivitys: 22.1.2026. Katso kuviosta väkiluku 2024M12. Helsinki: Tilastokeskus (Viitattu: 28.1.2026). Saantitapa: <https://stat.fi/indikaattori/vakiluku>
- [6] Tilastokeskus: Väestö 31.12.2024. Valitse ikäluokitus: 10-vuotiskä 0-9, 10-19,,90- ja paina "Valitse kaikki" ja paina "Näytä taulukko" (Viitattu: 28.1.2026) https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11rd.px/table/tableViewLayout1/
- [10] Hillilä Markku: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4>